SANTÉ ET SÉCURITÉ:
Risque d'incendie: Ininflammable
PRÉCAUTIONS:
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
POUDRE IRRITE LES YEUX, LA PEAU, ET LES MEMBRANES MUQUEUSES PEUT ÊTRE DANGEREUX EN CAS D'INGESTION OU D'INHALATION.
Ne pas mettre la poudre dans les yeux. Eviter le contact de la poudre avec la peau. Manipuler de manière à réduire au minimum l'émission de poudre en suspension. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Lors du mélange de la solution, porter des lunettes, des gants résistant aux produits chimiques et un masque. Il est recommandé que les travailleurs portent des combinaisons, des lunettes et un masque lors de l'application solution BIOXY H avec un brumisateur à main ou d'un nettoyeur haute pression.
Note: Lire la fiche signalétique avant d'utiliser ou de manipuler ce produit.
Contient 4% poudre de chlorure d'ammonium quaternaire



Autes Ingredients:
Tetraacetylethylenediamine, acide citrique, percarbonate de sodium et acide ethylenediaminetetraacetic

PRÉCAUTIONS
ÉVITER LA CONTAMINATION DES ALIMENTS.
PREMIERS SOINS:
A) Yeux: Rincer abondamment avec de l'eau. Si l'irritation persiste, appeler un médecin immédiatement.
B) Peau: Lorsqu'en poudre, enlever les vêtements contaminés. Laver à l'eau et au savon. Pas dangereux lorsqu'il est en solution.
C) Ingestion: Lorsqu'en poudre, laver la bouche avec beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin. Lorsque en solution, rincer la bouche avec de l'eau.
D) Inhalation: Lorsqu'en poudre, si les symptômes de la toux persiste, la suffocation, une respiration sifflante sont gênants, déplacer à l'air frais et consulter un spécialiste.
STOCKAGE: Conserver entre 15 et 25 ° C dans un endroit sec dans des contenants hermétiques.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI - NE PAS BOIRE LA SOLUTION
BIOXY H.
Fait au Canada
Pour usage industriel seulement

DATE D'EXPIRATION:

Lot#:

King Global

.

865A blvd. Mgr. Langlois
Valleyfield, Qc Canada

BIOXY H

BACTÉRICIDE
VIRUCIDE
FONGICIDE

DIN # 02414325

Veterinary species type 9410-42427-DIN

DÉSINFECTANT DE SURFACES

GUARANTIE / GUARANTEE:

-n-Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride..... 2.0%

-n-Alkyl (68% C12, 32% C14) Dimethyl Ethylbenzyl Ammonium Chloride. 2.0%

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

DISTRIBUTION MULTI-MAT INC.
450-531-4628

415 PRINCIPALE EST
ST-PAUL D'ABBOTSFORD
QC,J0E 1A0

DESCRIPTION
BIOXY H est un produit en poudre qui produit du chlorure d'ammonium quaternaire et de l'acide peracétique dans l'eau. BIOXY H a été conçu pour désinfecter les instruments médicaux non critiques et surfaces médicales. Il désinfecte les surfaces dans les usines alimentaires, des usines de breuvages et de la viande et des usines d'emballage. BIOXY H désinfecte les équipements et les surfaces dans les fermes d'élevage, il est également utilisé comme agent de nettoyage et de désinfection pour nettoyer et désinfecter les cages d'animaux. BIOXY H est un désinfectant de surface idéal dans les établissements vétérinaires, médicaux et dentaires. BIOXY H est un désinfectant moussant à large spectre, utilisé sur une base régulière, il tue les virus, les bactéries, les levures et les moisissures.
MODE D'EMPLOI / MISE EN GARDE :
Dans les bâtiments agricoles : les animaux doivent être retirés de la prémisse lors de la désinfection.
Dans les usines de transformation des aliments : pour les surfaces en contact avec les aliments, rincer abondamment à l'eau potable après désinfection .

- Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et de l'équipement :
Dans les bâtiments agricoles - Retirez tous les animaux des lieux. Enlever la litière et fumier sur le sols , les murs et autres surfaces des étables et des équipements. Brosser et souffler la poussière des ventilateurs , des moteurs , des persiennes et les équipements électriques . Pour le nettoyage des borne et de la désinfection , saturer toutes les surfaces avec un minimum de 1,2 % à 2% de la solution de p / v de BIOXY H (12 g à 20 g pour 1 litre , on obtiendra un 480-800 ppm de chlorure d'ammonium quaternaire actif) , à l'aide d'un nettoyeur à haute pression ou un brumisateur . **BIOXY H** doit rester en contact avec la surface à désinfecter pendant au moins 10 minutes. Frotter les ustensiles très sales et laisser tremper dans la solution de BIOXY H de 1,2% à 2 % p / v pendant 10 minutes (ne pas dépasser 45 minutes pour des objets métalliques) .
Dans les hôpitaux vétérinaires - Retirer les dépôts de saletés, ensuite mouiller généreusement les surfaces à désinfecter avec une solution de **BIOXY H** de 1,2% à 2% p / v (12 g à 20 g pour 1 litre , cela va donner de 480 à 800 ppm de chlorure d'ammonium quaternaire actif) , à l'aide d'un balai , d'une éponge ou de tissu , aussi bien que par pulvérisation. Un temps de contact minimum de 10 minutes est nécessaire. Pour les équipements de laboratoire et de pétanque, frottez ustensiles très sales et laisser tremper dans une solution de BIOXY H de 1,2% à 2 % p / v pour un minimum de 10 minutes (ne pas dépasser 45 minutes pour des objets métalliques) .
Dans les usines de transformation des aliments - Utilisez **BIOXY H** sur le matériel préalablement nettoyée . Utilisation **BIOXY H** à une concentration de solution de BIOXY H de 1,2% à 2% en poids / volume (12 g à 20 g pour 1 litre), on obtiendra un 480-800 ppm de chlorure d'ammonium quaternaire actif). Conserver cette solution en contact avec les surfaces alimentaires pendant au moins 10 minutes, puis rincer abondamment à l' eau potable.
Dans les établissements médicaux et dentaires - Utilisez **BIOXY H** sur l'équipement préalablement nettoyé et les instruments médicaux non critiques. Utiliser **BIOXY H** à une concentration en solution de **BIOXY H** de 1,2% à 3% en poids / volume (12 g à 30 g pour 1 litre), on obtiendra un 480-1200 ppm de chlorure d'ammonium quaternaire actif). Conserver cette solution en contact avec des surfaces et des équipements pendant au moins 10 minutes, puis rincer abondamment à l' eau potable.
- Pour la désinfection de l'air :
Pour remplacer la fumigation au formol dangereux et inefficace dans les bâtiments de ferme vides et les hôpitaux vétérinaires. Arrêter le système de ventilation pendant la désinfection. Utilisation d'une machine vaporisatrice mécanique dans le cadre du sous-programme de désinfection terminale avec une solution de 1,2% p / v de **BIOXY H**. Appliquer à raison d'un litre de solution par 100 m^3 avec une taille de particules ne dépassant pas 70 microns, afin d'obtenir un temps de contact minimal de 10 minutes avec des micro-organismes dans l'air. Quitter la salle pendant la formation de buée. Les utilisateurs et les animaux peuvent pénétrer dans la zone traitée une fois que le brouillard s'est dispersé. Aucun rinçage n'est nécessaire après la formation de buée.

ÉLIMINATION:
1) Rincer le contenant vide et ajouter les rinçures au site de traitement.
2) Suivre les instructions provinciales pour tout nettoyage additionnel nécessaire du récipient avant son élimination.
3) Rendre le récipient vide impropre à tout usage .
4) Éliminer le contenant conformément aux exigences provinciales.
5) Pour plus d'informations concernant l'élimination des produits non utilisés et le nettoyage des déversements, communiquer avec l'organisme de réglementation provincial ou au fabricant .